

## Bumetanide injectie (0,5 - 5 mg per spuit)

### Aandachtspunten

- Lees de bijsluiter.
- Neem de lokale werkvoorschriften in acht.
- No touch. Raak niets aan wat steriel of gedesinfecteerd is, en ervoor te zorgen dat de aansluitpunten niet in contact komen met de omgeving.
- Gesloten systeem. Zorg dat via de gebruikte infuusmaterialen zo min mogelijk of zo kort mogelijk een open verbinding is met de omgeving.

### Grondstoffen en materialen (PER GIFT)

- 1 - 3 st Burinex 0,5 mg/ml ampul 4 ml, oplossing voor injectie.

### Bereidingswijze

1. Trek het juiste volume op uit de ampul met een spuit.

### Houdbaarheid

Het eindproduct dient onmiddellijk te worden geïnjecteerd.

Na bereiden is het product 24 uur houdbaar bij kamertemperatuur.

## Bumetanide (0,5 - 10 mg per infuuszak)

### Aandachtspunten

- Lees de bijsluiters.
- Neem de lokale werkvoorschriften in acht.
- No touch. Raak niets aan wat steriel of gedesinfecteerd is, en ervoor te zorgen dat de aansluitpunten niet in contact komen met de omgeving.
- Gesloten systeem. Zorg dat via de gebruikte infuusmaterialen zo min mogelijk of zo kort mogelijk een open verbinding is met de omgeving.

### Grondstoffen en materialen (PER GIFT)

- 1 - 5 st Burinex 0,5 mg/ml ampul 4 ml, oplossing voor injectie.
- 1 st NaCl 0,9% 100 ml.

### Bereidingswijze

1. Trek het juiste volume op uit de ampul met een spuit.
2. Spuit dit volume bij in de infuuszak van 100 ml.

### Houdbaarheid

Het eindproduct dient onmiddellijk te worden geïnjecteerd.

Na bereiden is het product 24 uur houdbaar bij kamertemperatuur.