Bumetanide injectie (0,5 - 5 mg per spuit)

Aandachtspunten
- Lees de bijsluiter.
- Neem de lokale werkvoorschriften in acht.
- No touch. Raak niets aan wat steriel of gedesinfecteerd is, en ervoor te zorgen dat de aansluitpunten niet in contact komen met de omgeving.
- Gesloten systeem. Zorg dat via de gebruikte infuusmaterialen zo min mogelijk of zo kort mogelijk een openverbinding is met de omgeving.

Grondstoffen en materialen (PER GIFT)
> 1 - 3 st Burinex 0,5 mg/ml ampul 4 ml, oplossing voor injectie

Bereidingswijze
1. Trek het juiste volume op uit de ampul met een spuit.

Houdbaarheid
Het eindproduct dient onmiddellijk te worden geïnjecteerd.
Na bereiden is het product 24 uur houdbaar bij kamertemperatuur.

Bumetanide (0,5 - 10 mg per infuuszak)

Aandachtspunten
- Lees de bijsluiter.
- Neem de lokale werkvoorschriften in acht.
- No touch. Raak niets aan wat steriel of gedesinfecteerd is, en ervoor te zorgen dat de aansluitpunten niet in contact komen met de omgeving.
- Gesloten systeem. Zorg dat via de gebruikte infuusmaterialen zo min mogelijk of zo kort mogelijk een openverbinding is met de omgeving.

Grondstoffen en materialen (PER GIFT)
> 1 - 5 st Burinex 0,5 mg/ml ampul 4 ml, oplossing voor injectie
> 1 st NaCl 0,9% 100 ml

Bereidingswijze
1. Trek het juiste volume op uit de ampul met een spuit.
2. Spuit dit volume bij in de infuuszak van 100 ml

Houdbaarheid
Het eindproduct dient onmiddellijk te worden geïnjecteerd.
Na bereiden is het product 24 uur houdbaar bij kamertemperatuur.