

Piperacilline/Tazobactam (320/40 - 2000/250 mg infuus)

Aandachtspunten

- Lees de bijsluiter.
- Neem de lokale werkvoorschriften in acht.
- No touch. Raak niets aan wat steriel of gedesinfecteerd is, en ervoor te zorgen dat de aansluitpunten niet in contact komen met de omgeving.
- Gesloten systeem. Zorg dat via de gebruikte infuusmaterialen zo min mogelijk of zo kort mogelijk een open verbinding is met de omgeving.

Grondstoffen en materialen (PER GIFT)

- 1 st Piperacilline/Tazobactam 4 g/0,5 g poeder voor oplossing voor infusie.
- 1 st Water voor injecties flacon 100 ml (Oplosmiddel).
- 1 st NaCl 0,9% 100 ml.

Bereidingswijze

1. Voeg 10 ml Water voor Injecties aan één Piperacilline/Tazobactam flacon.
2. Schud zorgvuldig het flacon, concentratie bij benadering 170/20 mg per ml.
3. Controleer of alles is opgelost.
4. Bepaal met de dosis en de concentratie welke hoeveelheid bij benadering van de oplossing nodig is.
320/40 mg = 2 ml
1000/125 mg = 6 ml
2000/250 mg = 12 ml
5. Trek het gewenste volume Piperacilline/Tazobactam op in de spuit en voeg dit toe aan de infuuszak van 50 ml.

Houdbaarheid

Het eindproduct dient na bereiding onmiddellijk aangekoppeld worden.

Na bereiden is het product 8 uur houdbaar bij kamertemperatuur.

Piperacilline/Tazobactam (2000/250 - 4000/500 mg infuus)

Aandachtspunten

- Lees de bijsluiter.
- Neem de lokale werkvoorschriften in acht.
- No touch. Raak niets aan wat steriel of gedesinfecteerd is, en ervoor te zorgen dat de aansluitpunten niet in contact komen met de omgeving.
- Gesloten systeem. Zorg dat via de gebruikte infuusmaterialen zo min mogelijk of zo kort mogelijk een open verbinding is met de omgeving.

Grondstoffen en materialen (PER GIFT)

- 1 st Piperacilline/Tazobactam 4 g/0,5 g poeder voor oplossing voor infusie.
- 1 st Water voor injecties flacon 100 ml (Oplosmiddel).
- 1 st NaCl 0,9% 100 ml.

Bereidingswijze

1. Voeg 10 ml Water voor Injecties aan één Piperacilline/Tazobactam flacon.
2. Schud zorgvuldig het flacon, concentratie bij benadering 170/20 mg per ml.
3. Controleer of alles is opgelost.
4. Bepaal met de dosis en de concentratie welke hoeveelheid bij benadering van de oplossing nodig is.
2000/250 mg = 12 ml
3000/375 mg = 17 ml
4000/500 mg = alle oplossingen
5. Trek het gewenste volume Piperacilline/Tazobactam op in de spuit en voeg dit toe aan de infuuszak van 100 ml.

Houdbaarheid

Het eindproduct dient na bereiding onmiddellijk aangekoppeld worden.

Na bereiden is het product 8 uur houdbaar bij kamertemperatuur.