



Overzicht bereide en onbereide medicatie

Bij Mediq doen we er alles aan om infuuszorg op een aangename en veilige manier naar huis te brengen. Daarom bieden we een zeer ruime keus aan bereide en onbereide (intraveneuze) medicatie voor een infuuspomp of elastomeer. Zo kan uw patiënt de infuusbehandeling thuis, in zijn vertrouwde omgeving, voortzetten.

Mediq biedt een zeer uitgebreid assortiment aan bereide en onbereide medicatie die we op het door u gewenste tijdstip en locatie kunnen leveren. Voor alle therapieën geldt: op werkdagen voor 17 uur aangevraagd, betekent de volgende dag bij uw patiënt in huis. Is snelheid gewenst, dan vernemen wij dat graag. Zo kunt u iedere patiënt de juiste oplossing bieden.

Infuuspomp en hulpmiddelen

We helpen u graag om infuustherapie thuis mogelijk te maken. Om de druk op u als zorgprofessional te verlichten en bedden in het ziekenhuis vrij te maken. Mediq heeft jarenlange kennis, ervaring en alle hulpmiddelen in huis om u hierbij te ondersteunen. Ons assortiment infuuspompen

en hulpmiddelen is breed en onze voorraad groot. Wij hebben vrijwel altijd een oplossing voor specifieke wensen en behoeften. Hierdoor kunnen patiënten snel starten met de infuustherapie thuis. Vaak al binnen 24 uur. Doordat veel thuiszorgorganisaties en instellingen onze infuuspompen in consignatie hebben, krijgt de patiënt snel de zorg die nodig is. Onze startpakketten zorgen ervoor dat zorgverleners thuis meteen bij de start van de therapie over het juiste materiaal kunnen beschikken.

We helpen u graag

We doen alles voor een zo'n aangenaam mogelijke start van de therapie. Bestelt u naast medicatie ook een pomp en hulpmiddelen voor uw patiënt, dan zorgen wij dat alles tijdig bij de patiënt thuis geleverd wordt. Uw patiënt kan na ontslag uit het ziekenhuis dan direct zijn therapie thuis veilig en effectief voortzetten. Wilt u medicatie aanvragen die niet op het overzicht staat? Neem dan contact op met onze klantenservice via 088 888 9480 of infuustherapie@mediq.com



at the heart of healthcare

Overzicht bereide medicatie | antibiotica

IV-medicatie in infuuszak, medicatiecassette en elastomeerpompen				Toedieningsvorm				
Geneesmiddel	Max. conc. (mg/ml)	Sterkte (mg)	Volume (ml)	Infuus-zak	Cassette	Elasto-meer-pomp*	HBH en bewaarconditie	Continu toediening mogelijk
Amoxicilline	5	≤ 1250	250	✓	✓	✓	5 dagen koel, 24 uur KT	Ja
		1250-2500	500	✓				
		2500-5000	1000	✓				
		6000	1200	✓				
		12000	2400	✓				
Benzyl-penicilline	100.000 IE/ml	≤10 MIE	100	✓	✓	✓	15 dagen koel, 24 uur KT	Ja
		12-24 MIE	250	✓	✓	✓		
Cefazoline	60	≤ 6000	100	✓	✓	✓	14 dagen koel, 24 uur KT	Ja
Cefotaxim	60	≤ 6000	100	✓	✓ **	✓ ***	14 dagen koel, 12 uur KT (24 uur indien gekoeld toegediend(!))	Ja, 12 uur houdbaar bij kamertemperatuur, dus 2 x daags 12 uur aanhangen bij kamertemperatuur via elastomeerpomp of 24 uur bij gekoelde infusie via cassette of 100 ml infuuszak
		6000-15000	250	✓	✓ **	✓ ***		
		> 15000	500	✓				
Ceftazidim	60	≤ 6000	100	✓	✓	✓	8 dagen koel, 24 uur KT	Ja
		6000-15000	250	✓	✓	✓		
Ceftriaxon	50	≤ 5000	100	✓	✓	✓	14 dagen koel, 24 uur KT	Ja, 1 maal daagse dosering, continue toediening niet noodzakelijk Toedieningsduur van min. 30 minuten bij doseringen ≥ 1 gram. Ceftriaxon bereiding (2000mg in 20ml) in wegwerpspuit mogelijk.
Cefuroxim	90	≤ 9000	100	✓	✓	✓	8 dagen koel, 24 uur KT	Ja
Clindamycine	12	≤ 1200	100	✓	✓	✓	14 dagen koel, 24 uur KT	Ja
		1200-3000	250	✓	✓	✓		
Colistine	6,4	≤ 640	100	✓	✓	✓	8 dagen koel, 24 uur KT	Ja
Ertapenem	20	≤ 2000	100	✓	✓	✓ ***	5 dagen koel, 6 uur KT	Ja, 1 maal daagse dosering, continue toediening niet noodzakelijk. Aanbevolen toedieningsduur is 30 minuten.
Flucloxacilline	50	≤ 5000	100	✓	✓	✓	7 dagen koel, 24 uur KT	Ja
		5000-12500 ³	250	✓	✓	✓		
		> 12500	500	✓				
Gentamicine	5	≤ 250	50	✓	✓	✓	10 dagen koel, 24 uur KT	Nee, aanbevolen toedieningsduur is 30 minuten.
		250 - 500	100	✓	✓	✓		

IV-medicatie in infuuszak, medicatiecassette en elastomeerpompen				Toedieningsvorm				
Geneesmiddel	Max. conc. (mg/ml)	Sterkte (mg)	Volume (ml)	Infuus-zak	Cassette	Elasto-meer-pomp*	HBH en bewaarconditie	Continu toediening mogelijk
Meropenem	20	≤ 2000	100	✓	✓ **	✓ ***	5 dagen koel waarvan max. 12 uur KT (24 uur indien gekoeld toegediend(!))	Ja, 12 uur houdbaar bij kamertemperatuur, dus 2 x daags 12 uur aanhangen bij kamertemperatuur via elastomeerpomp of 24 uur bij gekoelde infusie via cassette of 100 ml infuuszak
		2000-5000	250	✓	✓ **	✓ ***		
		5000-10000	500	✓				
Piperacilline/tazobactam	90 (80/10) ¹	4500 (4/0,5 g)	50	✓	✓	✓	8 dagen koel, 24 uur KT	Ja
		9000 (8/1 g)	100	✓	✓	✓		
		13500 (12/1,5g)	250	✓	✓	✓		
		18000 (16/2g)	250	✓	✓	✓		
Teicoplanine	11	≤ 1100	100	✓	✓	✓	8 dagen koel, 24 uur KT	Ja, 1 maal daagse dosering, dus continue toediening niet noodzakelijk. Toedieningsduur van 30 minuten.
		1100-2750	250	✓	✓	✓		
Tobramycine	10	≤ 1000	100	✓	✓	✓	14 dagen koel, 48 uur KT	Nee, aanbevolen toedieningsduur is 20-60 minuten.
Vancomycine	10	≤ 1000	100	✓	✓	✓	14 dagen koel, 24 uur KT	Ja
		1000-2500	250	✓	✓	✓		
		2500-5000	500	✓				
	40 ²	≤ 4000	100	✓	✓	✓		
		4000-10000	250	✓	✓	✓		

¹ Vanwege osmotische waarde hebben de doseringen een vast volume, hiervan kan niet worden afgeweken.

² Centraal toedienen (o.a. via PICC) van vancomycine is mogelijk tot een maximale concentratie van 40mg/ml.

³ Ter overweging voor het toedienen van flucloxacilline perifeer informatie omtrent de osmotische waarde: Osmotische waarde 12 gram in 250ml is 430 mOsm/l

* Elastomeerpompen hebben een vaste inloopsnelheid en kunnen ingezet worden voor zowel continu toediening als intermitterende toediening. Er bestaan veel verschillende soorten elastomeerpompen, waardoor iedere gewenste inlooptijd bereikt kan worden. Rekening houdend met het minimale volume uit de tabel hierboven, kunnen we de geschikte elastomeerpomp selecteren. In de tabel hieronder staan de meest gebruikte soorten.

** Gekoelde toediening alleen van toepassing op 100 & 250ml cassettes

*** Bij toediening via elastomeerpomp geen actief gekoelde toediening mogelijk

	Elastomeerpomp	Volume	Inlooptijd
Continu	5 ml/uur	120 ml	24 uur
	10 ml/uur	240 ml	24 uur
Intermitterend	100 ml/uur	100 ml	1 uur
	200 ml/uur	100 ml	½ uur

Overzicht bereide medicatie | overig

IV-medicatie in infuuszak, medicatiecassette en elastomeerpompen				Toedieningsvorm				
Geneesmiddel	Max. conc. (mg/ml)	Sterkte (mg)	Volume (ml)	Infuus-zak	Cassette	Elasto-meer-pomp*	HBH en bewaarconditie	Continu toediening mogelijk
Aciclovir	10	≤ 1000	100	✓	✓	✓	14 dagen koel, 7 dagen KT	Ja
		1000-2500	250	✓	✓	✓		
		2500-5000	500	✓				
		5000-10000	1000	✓				
Amfotericine B	0,5	≤ 50	100	✓	✓	✓	5 dagen koel, 24 uur KT	Ja, 1 maal dagse dosering, continue toediening niet noodzakelijk. Aanbevolen toedieningsduur is 2 tot 6 u.
		50-125	250	✓	✓	✓		
Deferoxamine	100	≤ 10000	100	✓	✓	✓	15 dagen koel, 48 uur KT	Ja
Dobutamine	10	≤ 1000	100	✓	✓	✓	14 dagen koel, 7 dagen KT	Ja
Esketamine	5	500	100	✓	✓		14 dagen koel, 7 dagen KT	Ja
Ganciclovir	5	500	100	✓	✓	✓	14 dagen koel, 7 dagen KT	Ja, bij 1 maal dagse dosering is continue toediening niet noodzakelijk. Aanbevolen toedieningsduur is 1 uur.
Heparine (in wwsp)		500 IE	10				37 dagen koel, 7 dagen KT	Niet van toepassing
		1000 IE	10					
Fentanyl	50 mcg/ml	≤ 5000 mcg	100	✓	✓	✓	14 dagen koel, 7 dagen KT	Ja
Furosemide	10	≤ 1000	100	✓	✓	✓	14 dagen koel, 7 dagen KT	Ja
Methyl-prednisolon	10	≤ 1000	100	✓	✓	✓	14 dagen koel, 48 uur KT	Ja
Micafungine	1	100	100	✓	✓	✓	7 dagen koel, 24 uur KT	Ja, 1 maal dagse dosering, dus continue toediening niet noodzakelijk. Aanbevolen toedieningsduur is 1 uur.
Metoclopramide	5	≤ 500	100	✓	✓		14 dagen koel, 7 dagen KT	Ja
Morfine	10	1000	100		✓		14 dagen koel, 7 dagen KT	Ja
		2000-5000	250	✓	✓	✓	14 dagen koel, 7 dagen KT	Ja
Oxycodon	50	≤ 5000	100	✓	✓	✓	14 dagen koel, 7 dagen KT	Ja
Piritramide	10	≤ 1000	100	✓	✓	✓	14 dagen koel, 7 dagen KT	Ja
Voriconazol	4	≤ 400	100	✓	✓	✓	8 dagen koel, 24 uur KT	Ja
		400-1000	250	✓	✓	✓		
Sufentanil	20	≤ 2000 mcg	100	✓		✓	14 dagen koel, 3 dagen KT	Ja
Pantoprazol	0,8	40 mg	100	✓			14 dagen koel, 3 dagen KT	Ja, bij 1 maal dagse dosering is continue toediening niet noodzakelijk. Aanbevolen toedieningsduur is 15 minuten

Overzicht onbereide intraveneuze medicatie*

	Beschikbare zak/flacon	Beschikbare ampul	Beschikbare flacon
Amoxicilline/Clavulaanzuur			500/50 mg of 1000/200 mg
Amoxicilline			1000 mg
Bumetanide		Burinex 0,5 mg/ml, 4 ml	
Fluconazol	2mg/ml, 50ml of 200ml		
Furosemide		10 mg/ml, 4 ml of 25 ml	
Imipenem / cilastatine			500/500 mg
Metronidazol	5mg/ml, 100ml		
Piperacilline / tazobactam			4/0,5 g of 4/0,25 g

* Zie QR code (onderin) voor bijbehorende handboek Parenteralia



Download
Handboek Parenteralia



Download
Medicatie overzicht

 MEDIQ *at the heart of healthcare*